

Σχέσεις

Διδάσκοντες: **Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο




Διμελής Σχέση

- Διατεταγμένο ζεύγος (α , β):
 - Δύο αντικείμενα (όχι κατ' ανάγκη διαφορετικά) σε καθορισμένη σειρά.
 - Γενίκευση: διατεταγμένη τριάδα (α , β , γ), διατεταγμένη n -άδα ($\alpha_1, \dots, \alpha_n$).
- Καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$:
 - $A \times B = \{(\alpha, b) : \alpha \in A \text{ και } b \in B\}$
 - Γενίκευση: $A_1 \times \dots \times A_n = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \alpha_1 \in A_1, \dots, \alpha_n \in A_n\}$
- Διμελής σχέση R από σύνολο A σε σύνολο B : $R \subseteq A \times B$.
 - α σχετίζεται με β (στην R): $(\alpha, \beta) \in R$.
 - $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(\alpha, 1), (\alpha, 4), (\beta, 2), (\beta, 4), (\gamma, 1), (\gamma, 3)\}$
 - A φοιτητές, B μαθήματα, R δηλώσεις μαθημάτων.
 - A υποψήφιοι εργαζόμενοι, B εταιρείες, R αιτήσεις πρόσληψης.
- Τριμελής σχέση R : $R \subseteq A \times B \times \Gamma$.
η-μελής σχέση R : $R \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$.

Αναπαράσταση

- Αναπαράσταση διμελούς σχέσης R :
 - **Σύνολο:** παράθεση διατεταγμένων ζευγών.
 - **Κατηγόρημα:** χαρακτηριστική ιδιότητα σχετιζόμενων στοιχείων.
 - **Συσχέτιση:** Boolean πίνακας, κατευθυνόμενο γράφημα.


	1	2	3	4
a	✗	0	0	✗
β	0	✗	0	✗
γ	✗	0	✗	0



$$A = \{a, \beta, \gamma\}, B = \{1, 2, 3, 4\}, \\ R = \{(a, 1), (a, 4), (\beta, 2), (\beta, 4), (\gamma, 1), (\gamma, 3)\}$$

Στο Ίδιο Σύνολο

- Διμελής σχέση R στο σύνολο A : $R \subseteq A \times A$.
 - Σχέσεις μεταξύ αριθμών ($<$, \geq , α διαιρεί β, ...), ανθρώπων, συνόλων, κλπ.
 - Γράφημα: κορυφές στοιχεία A , ακμή (α, β) δηλώνει $(\alpha, \beta) \in R$.




Ιδιότητες Διμελών Σχέσεων

- **Ανακλαστική:** για κάθε $a \in A$, $(a, a) \in R$.
 - Συμπληρωμένη διαγώνιος. Όλες οι κορυφές έχουν ανακύκλωση.
- **Συμμετρική:** για κάθε $(a, b) \in R$, έχουμε $(b, a) \in R$.
 - Συμμετρία ως προς διαγώνιο. Μη κατευθυνόμενο γράφημα.
- **Αντισυμμετρική:** Αν $(a, b), (b, a) \in R$, τότε $a = b$.
 - Εκτός διαγωνίου, ≤ 1 από κάθε ζεύγος «συμμετρικών» θέσεων.
 ≤ 1 ακμή για κάθε ζεύγος **διαφορετικών** κορυφών.
 - Υπάρχει σχέση συμμετρική και αντισυμμετρική;
- **Μεταβατική:** για κάθε $(a, b), (b, c) \in R$, έχουμε $(a, c) \in R$.
 - Αν υπάρχει $a - c$ μονοπάτι, τότε υπάρχει (a, c) ακμή.

Παραδείγματα

- Σχέση $\alpha|\beta$ (α διαιρεί β , στο N).
 - Ανακλαστική, όχι συμμετρική, αντισυμμετρική, μεταβατική.
 - Π.χ. γράφημα σχέσης $\alpha|\beta$ στο $\{1, \dots, 12\}$.



Παραδείγματα


- $R_1 = \{(a, \beta) : a \leq \beta\}$
 - Ανακλαστική, όχι συμμετρική, αντισυμμετρική, μεταβατική.
- $R_2 = \{(a, \beta) : a > \beta\}$
 - 'Όχι ανακλαστική, όχι συμμετρική, αντισυμμετρική, μεταβατική.
- $R_3 = \{(a, \beta) : |a| = |\beta|\}$
 - Ανακλαστική, συμμετρική, όχι αντισυμμετρική, μεταβατική.
- $R_4 = \{(a, \beta) : a = \beta\}$
 - Ανακλαστική, συμμετρική, αντισυμμετρική, μεταβατική.
- $R_5 = \{(a, \beta) : a + \beta \leq 3\}$
 - 'Όχι ανακλαστική, συμμετρική, όχι αντισυμμετρική, όχι μεταβατική.
- $R_6 = \{(A, B) : A \subseteq B\}$
 - Ανακλαστική, όχι συμμετρική, αντισυμμετρική, μεταβατική.

Πράξεις μεταξύ Σχέσεων

- Σχέσεις (στα ίδια σύνολα) συνδυάζονται με **πράξεις συνόλων**:
 - 'Ενωση, τομή, διαφορά, συμπλήρωμα, συμμετρική διαφορά.
 - Πως **υπολογίζονται** από αναπαράσταση με **πίνακα ή γράφημα**;
- **Αντίστροφη σχέση** $R^{-1} = \{(\beta, \alpha) : (\alpha, \beta) \in R\}$
 - R φοιτητές δηλώνουν μαθήματα:
 R^{-1} μαθήματα δηλώνονται από φοιτητές.
 - **Ανάστροφος πίνακας**, αντίστροφή φοράς των ακμών.
- **Σύνθεση** $S \circ R \subseteq A \times \Gamma$ σχέσεων $R \subseteq A \times B$ και $S \subseteq B \times \Gamma$:
 - $S \circ R = \{ (\alpha, \gamma) : \exists \beta \text{ τ.ω. } (\alpha, \beta) \in R \text{ και } (\beta, \gamma) \in S \}$
 - Σύνθεση συναρτήσεων προκύπτει ως ειδική περίπτωση.
 - Δεν είναι αντιμεταθετική!
 - Υπολογισμός με **Boolean πολλαπλασιασμό πινάκων**.

Πράξεις μεταξύ Σχέσεων

- Σύνθεση σχέσης $R \subseteq A \times A$ με τον εαυτό της: $R^2 = R \circ R$.
- n -οστή «δύναμη» σχέσης $R \subseteq A \times A$: $R^n = R^{n-1} \circ R$, $R^1 = R$.
 - $R^3 = (R \circ R) \circ R$, $R^4 = ((R \circ R) \circ R) \circ R$, ...
 - Υπολογισμός με Boolean πολλαπλασιαμό πινάκων.
 - «Διαδρομή» μήκους $k \geq 0$ σε σχέση R : ακολουθία $a_0, \dots, a_k \in A$ τ.ω. $(a_i, a_{i+1}) \in R$ για κάθε $i < k$.
 - $R^n = \{(a, \beta) : \text{υπάρχει } a - \beta \text{ διαδρομή μήκους } n \text{ στην } R\}$
 - Απόδειξη με επαγωγή (άσκηση).



Πράξεις μεταξύ Σχέσεων

- Σχέση $R \subseteq A \times A$ **μεταβατική** ανν $R^n \subseteq R$ για $n = 1, 2, 3, \dots$
- $R^n \subseteq R$ για $n = 1, 2, 3, \dots$. Άρα και $R^2 \subseteq R$.
 - Για κάθε $(\alpha, \beta), (\beta, \gamma) \in R$, έχουμε $(\alpha, \gamma) \in R^2 \subseteq R$.
 - Άρα $(\alpha, \gamma) \in R$, και R μεταβατική.
- R μεταβατική. Απόδειξη με **επαγωγή** ότι $R^n \subseteq R$, για $n = 1, 2, \dots$
 - Βάση: $R \subseteq R$, ισχύει τετριμμένα για $n = 1$.
 - Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι $R^n \subseteq R$ για αυθαίρετο $n \geq 1$.
 - Επαγωγικό βήμα: Θδο $\forall (\alpha, \gamma) \in R^{n+1}, (\alpha, \gamma) \in R$.
 - $(\alpha, \gamma) \in R^{n+1}$
 - $(\text{ορισμός } R^{n+1}) \Rightarrow \exists \beta \text{ τ.ω. } (\alpha, \beta) \in R \text{ και } (\beta, \gamma) \in R^n$
 - $(\text{επαγ. υπόθ. } R^n \subseteq R) \Rightarrow \exists \beta \text{ τ.ω. } (\alpha, \beta) \in R \text{ και } (\beta, \gamma) \in R$
 - $(R \text{ μεταβατική}) \Rightarrow (\alpha, \gamma) \in R$

Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

- (Συστήματα Διαχείρισης) **Βάσεων Δεδομένων** (DBMSs) επιτρέπουν αποδοτική **αποθήκευση** και **επεξεργασία** μεγάλου όγκου δεδομένων.
- Σχεσιακές ΒΔ βασίζονται σε **n-μελείς σχέσεις**:
 - Δεδομένα αποθηκεύονται σε **πίνακες**.
 - Πίνακας: **n-μελής σχέση** (στήλες: **πεδία**, #στηλών: **βαθμός πίνακα**).
 - Στοιχεία σχέσης: **εγγραφές**.

Πίνακας 1: **Φοιτητές**

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατέρα	Α.Μ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041
Παπαδόπουλος	Απόστολος	Αθανάσιος	996
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850
Νικολάου	Απόστολος	Ανδρέας	1201

Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

- (Πρωτεύον) κλειδί πίνακα: πεδίο με **μοναδική τιμή** σε κάθε εγγραφή.
 - Τιμή **κλειδιού** προσδιορίζει μοναδικά εγγραφή πίνακα.

Πίνακας 1: **Φοιτητές**

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατέρα	Α.Μ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041
Παπαδόπουλος	Απόστολος	Αθανάσιος	996
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850
Νικολάου	Απόστολος	Ανδρέας	1201

Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

- (Πρωτεύον) κλειδί πίνακα: πεδίο με **μοναδική τιμή** σε κάθε εγγραφή.
 - Τιμή **κλειδιού** προσδιορίζει μοναδικά εγγραφή πίνακα.
- Αν ένα πεδίο δεν αρκεί, **σύνθετο (πρωτεύων)** κλειδί: καρτεσιανό γινόμενο ≥ 2 πεδίων ώστε τιμή να **προσδιορίζει μοναδικά** εγγραφή.

Πίνακας 2: **Μαθήματα – Βαθμολογία**

A.Μ.	Μάθημα	Βαθμ.	Εξετ.
1041	Διακριτά Μαθηματικά	10	6/2007
1041	Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα	10	2/2008
1041	Κρυπτογραφία	8.5	2/2009
850	Διακριτά Μαθηματικά	8.5	9/2006
850	Βάσεις Δεδομένων	10	2/2007

Επιλογή

- η-μελής σχέση R, **C συνθήκη** για στοιχεία R.
- **Επιλογή** (γραμμών) από **R** υπό **συνθήκη C**:
 - η-μελής σχέση με στοιχεία R που **ικανοποιούν** συνθήκη C.
 - Επιλογή από Φοιτητές με 'Όνομα = «Δημήτριος».
 - Επιλογή από Φοιτητές με **ΑΜ ≤ 950**.

Πίνακας 1: **Φοιτητές**

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατέρα	Α.Μ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041
Παπαδόπουλος	Απόστολος	Αθανάσιος	996
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850
Νικολάου	Απόστολος	Ανδρέας	1201

Επιλογή

- η-μελής σχέση R, **C συνθήκη** για στοιχεία R.
- **Επιλογή** (γραμμών) από **R** υπό **συνθήκη C**:
 - η-μελής σχέση με στοιχεία R που **ικανοποιούν** συνθήκη C.
 - Επιλογή από Φοιτητές με 'Όνομα = «Δημήτριος».
 - Επιλογή από Φοιτητές με **ΑΜ ≤ 950**.
 - Επιλογή από Μαθ-Βαθμ. με **Μάθημα = «Διακριτά»** και **Βαθμ ≥ 8.0**

Πίνακας 2: **Μαθήματα – Βαθμολογία**

A.Μ.	Μάθημα	Βαθμ.	Εξετ.
1041	Διακριτά Μαθηματικά	10	6/2007
1041	Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα	10	2/2008
1041	Κρυπτογραφία	8.5	2/2009
850	Διακριτά Μαθηματικά	8.5	9/2006
850	Βάσεις Δεδομένων	10	2/2007

Προβολή

- η-μελής σχέση R , **πεδία** (στήλες) (i_1, i_2, \dots, i_k) της R .
- **Προβολή** (επί στηλών) (i_1, i_2, \dots, i_k) της R :
 - k -μελής σχέση με στοιχείο $(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k})$ για κάθε στοιχείο $(a_1, a_2, \dots, a_m) \in R$ (μια φορά κάθε k -αδα).
 - Προβολή **Φοιτητές** στην στήλη 'Όνομα και 'Όνομα Πατέρα.

Πίνακας 1: **Φοιτητές**

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατέρα	Α.Μ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041
Παπαδόπουλος	Απόστολος	Αθανάσιος	996
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850
Νικολάου	Απόστολος	Ανδρέας	1201

Προβολή

- η-μελής σχέση R , **πεδία** (στήλες) (i_1, i_2, \dots, i_k) της R .
- **Προβολή** (επί στηλών) (i_1, i_2, \dots, i_k) της R :
 - k -μελής σχέση με στοιχείο $(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k})$ για κάθε στοιχείο $(a_1, a_2, \dots, a_m) \in R$ (μια φορά κάθε k -αδα).
 - Προβολή **Φοιτητές** στην στήλη 'Όνομα και 'Όνομα Πατέρα.
 - Προβολή **Μαθ-Βαθμ.** στις στήλες **Μάθημα** και **Εξεταστική**.

Πίνακας 2: **Μαθήματα – Βαθμολογία**

A.Μ.	Μάθημα	Βαθμ.	Εξετ.
1041	Διακριτά Μαθηματικά	10	6/2007
1041	Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα	10	2/2008
1041	Κρυπτογραφία	8.5	2/2009
850	Διακριτά Μαθηματικά	8.5	9/2006
850	Βάσεις Δεδομένων	10	2/2007

Συνένωση (Join)

- n -μελής σχέση R , m -μελής σχέση S , με p κοινά πεδία.
- **Συνένωση** R και S επί p κοινών πεδίων:
 - $(n+m-p)$ -μελής σχέση με στοιχεία
$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-p}, b_1, \dots, b_p, c_1, c_2, \dots, c_{m-p})$$
όπου $(a_1, a_2, \dots, a_{n-p}, b_1, \dots, b_p) \in R$
και $(b_1, \dots, b_p, c_1, c_2, \dots, c_{m-p}) \in S$
 - Σχέση συνένωσης: προβολή (στα $n+m-p$ διαφορετικά πεδία) επί υποσυνόλου της $R \times S$ με εγγραφές με ίδια τιμή στα κοινά πεδία.

Παράδειγμα Συνένωσης

Πίνακας 1: Φοιτητές

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατέρα	Α.Μ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041
Παπαδόπουλος	Απόστολος	Αθανάσιος	996
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850
Νικολάου	Απόστολος	Ανδρέας	1201

Πίνακας 2: Μαθήματα – Βαθμολογία

Α.Μ.	Μάθημα	Βαθμ.	Εξετ.
1041	Διακριτά Μαθηματικά	10	6/2007
1041	Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα	10	2/2008
1041	Κρυπτογραφία	8.5	2/2009
850	Διακριτά Μαθηματικά	8.5	9/2006
850	Βάσεις Δεδομένων	10	2/2007

Παράδειγμα Συνένωσης

Πίνακας 3: Φοιτητές – Βαθμολογία

Επώνυμο	Όνομα	Ον. Πατ.	Α.Μ.	Μάθημα	Βαθμ.	Εξετ.
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041	Διακριτά Μαθηματικά	10	6/2007
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041	Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα	10	2/2008
Φωτάκης	Δημήτριος	Ανδρέας	1041	Κρυπτογραφία	8.5	2/2009
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850	Διακριτά Μαθηματικά	8.5	9/2006
Αθανασίου	Δημήτριος	Ανδρέας	850	Βάσεις Δεδομένων	10	2/2007