

Μαθηματική Επαγωγή

Διδάσκοντες: **Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο





Τεχνικές Απόδειξης

- Εξαντλητική μέθοδος: **πεπερασμένος** αριθμός περιπτώσεων.
- Απόδειξη για $p \rightarrow q$:
 - Ευθέως: αιτιολογούμε ότι συμπέρασμα q έπειται από υπόθεση p .
 - **Αντιθετοαναστροφή**: αιτιολογούμε ότι η άρνηση της υπόθεσης ($\neg p$) έπειται από την άρνηση του συμπεράσματος ($\neg q$).
 - Ιδιότητα $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
 - Π.χ. αν n^2 περιπτώς, τότε n περιπτώς.
 - **Απαγωγή σε άτοπο**: Υποθέτουμε ότι $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ και αιτιολογούμε **αντίφαση**.
 - Π.χ. το $\sqrt{2}$ είναι άρρητος (Πυθαγόρας).
- Μαθηματική Επαγωγή
 - Εκμεταλλευόμαστε **διάταξη** με **minimal στοιχεία** σε ένα σύνολο, και αποδεικνύουμε ιδιότητες για τα στοιχεία του.

Αποδείξεις Ύπαρξης

- Κατασκευαστικές αποδείξεις ύπαρξης.
 - Αλγόριθμος κατασκευής του ζητούμενου.
- Μη κατασκευαστικές αποδείξεις ύπαρξης.
 - **Αρχή περιστερώνα.**
 - Αν m μπάλες σε n κουτιά και $m > n$,
υπάρχει κουτί έχει περισσότερες από 1 μπάλες.
 - **Πιθανοτική μέθοδος.**
 - Αν κάτι έχει θετική πιθανότητα να επιλεγεί από (κατάλληλο) δειγματοχώρο, τότε υπάρχει.
 - **Επιχειρήματα ισοτιμίας.**
 - Κάθε ακυκλικό κατευθυνόμενο γράφημα
έχει ≥ 1 «καταβόθρα» / minimal στοιχείο.
 - Κάθε (μη κατευθυνόμενο) γράφημα έχει άρτιο
αριθμό κορυφών περιπτού βαθμού.
 - Σε κατευθυνόμενο γράφημα με $\text{in-degree} \leq 1$ και
 $\text{out-degree} \leq 1$, αν v με $\text{in-degree}(v) = 0$,
τότε υπάρχει κορυφή w με $\text{out-degree}(w) = 0$.



Μαθηματική Επαγωγή

- Αποδεικνύουμε ότι « $P(n)$ αληθεύει για κάθε φυσικό $n \geq n_0$ ».
 - **Δομική επαγωγή**: όλα τα στοιχεία (αριθμήσιμα) άπειρου συνόλου που ορίζεται αναδρομικά έχουν ιδιότητα P .

Αρχή Μαθηματικής Επαγωγής

- Έστω $P(n)$ μια πρόταση που εξαρτάται από φυσικό αριθμό n .
- Για νδο $P(n)$ αληθεύει για κάθε φυσικό $n \geq n_0$, αρκεί νδο:
 - **Βάση**: το $P(n_0)$ αληθεύει.
 - **Βήμα**: για κάθε $n \geq n_0$, αν $P(n)$ αληθεύει, τότε $P(n+1)$ αληθεύει.

Αρχή Ισχυρής Μαθηματικής Επαγωγής

- Για νδο $P(n)$ αληθεύει για κάθε $n \geq n_0$, αρκεί νδο:
 - **Βάση**: το $P(n_0)$ αληθεύει.
 - **Βήμα**: για κάθε $n \geq n_0$, αν $P(k)$ αληθεύει για κάθε $k \in \{n_0, \dots, n\}$, τότε $P(n+1)$ αληθεύει.

'Οροι Γεωμετρικής Προόδου

- Να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 0$, $1+2+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1$.
 - Πρόταση $P(n) \equiv «1+2+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1»$.
 - Βάση: Αληθεύει για $n = 0$: $2^0 = 1 = 2 - 1$.
 - Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι για (αυθαίρετα επιλεγμένο) $n \geq 0$, αληθεύει $P(n)$, δηλ. ότι $1+2+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1$.
 - Επαγωγικό βήμα: Θδο αληθεύει $P(n+1)$, δηλ. ότι $1+2+\dots+2^n+2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

$$\overbrace{1 + 2 + 2^2 \dots + 2^n}^{=2^{n+1}-1} + 2^{n+1} = 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} \\ = 2^{n+2} - 1$$

- Νδο για κάθε $r \neq 1$ και $n \geq 0$,

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Αρμονικοί Αριθμοί

- Αρμονικός αριθμός τάξης k : $H_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k}$
- Να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 0$, $1 + \frac{n}{2} \leq H_{2^n} \leq 1 + n$
 - Συνεπώς $1 + \frac{1}{2} \log_2 k \leq H_k \leq 1 + \log_2 k$
 - Άνω φράγμα, πρόταση $P(n) \equiv «H_{2^n} \leq 1 + n»$
 - Βάση: Αληθεύει για $n = 0$: $H_1 = 1 = 1+0$.
 - Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι για (αυθαίρετα επιλεγμένο) $n \geq 0$, αληθεύει $P(n)$, δηλ. ότι $H_{2^n} \leq 1 + n$

Αρμονικοί Αριθμοί

- **Επαγωγικό βήμα:** Θδο αληθεύει $P(n+1)$,
δηλ. ότι $H_{2^{n+1}} \leq 1 + (n + 1)$

$$H_{2^{n+1}} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n + 1} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}$$

Αρμονικοί Αριθμοί

- **Επαγωγικό βήμα:** Θδο αληθεύει $P(n+1)$,
δηλ. ότι $H_{2^{n+1}} \leq 1 + (n + 1)$

$$\begin{aligned} H_{2^{n+1}} &= \overbrace{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n + 1} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}}^{=H_{2^n} \leq 1+n} \\ &\leq 1 + n + \overbrace{\frac{1}{2^n + 1} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}}^{2^n \text{ όροι } < \frac{1}{2^n}} \\ &\leq 1 + n + 2^n \frac{1}{2^n} \\ &= 1 + (n + 1) \end{aligned}$$

Διαιρετότητα

- Να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 1$, το $n^3 + 2n$ διαιρείται από το 3.
 - **Βάση:** Αληθεύει για $n = 1$: Το 3 διαιρείται από το 3.
 - **Επαγωγική υπόθεση:** Έστω ότι για (αυθαίρετα επιλεγμένο) $n \geq 1$, το $n^3 + 2n$ διαιρείται από το 3.
 - **Επαγωγικό βήμα:** Θδο το $(n+1)^3 + 2(n+1)$ διαιρείται από το 3.
 - Πράγματι,

$$\begin{aligned}(n+1)^3 + 2(n+1) &= (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + 2(n+1) \\ &= (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1),\end{aligned}$$

όπου και οι δύο όροι διαιρούνται από το 3 (ο 1^{ος} λόγω της επαγωγικής υπόθεσης).

Πληθάριθμος Δυναμοσυνόλου

- Νδο για κάθε (πεπερασμένο) σύνολο A με n στοιχεία, το δυναμοσύνολο του A έχει 2^n στοιχεία.
 - Μαθηματική επαγωγή στο n (πληθικό αριθμό συνόλου A).
 - **Βάση:** Αληθεύει για $n = 0$: $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ και $|P(\emptyset)| = 2^0$.
 - **Επαγωγική υπόθεση:** Έστω ότι για (αυθαίρετα επιλεγμένο) $n \geq 0$, αληθεύει ότι για κάθε σύνολο A με $|A| = n$, $|P(A)| = 2^n$.
 - **Επαγωγικό βήμα:** Θδο \forall σύνολο A με $|A| = n+1$, $|P(A)| = 2^{n+1}$.
 - A (αυθαίρετα επιλεγμένο) σύνολο με $n+1$ στοιχεία.
Θεωρούμε $x \in A$ και $A_x = A - \{x\}$ με $|A_x| = n$.
 - Κάθε υποσύνολο του A είτε περιέχει το x είτε όχι.
 - Σε κάθε υποσύνολο $S \subseteq A_x$ αντιστοιχούν δύο υποσύνολα του A : το S και το $S \cup \{x\}$.
 - Άρα $|P(A)| = 2 \cdot |P(A_x)| = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$.

Λάθος Χρώμα!

- Να βρείτε το **λάθος** στον παρακάτω επαγωγικό συλλογισμό.
- Θδο για κάθε $n \geq 1$, σε **κάθε σύνολο n αυτοκινήτων, όλα τα αυτοκίνητα έχουν το ίδιο χρώμα.**
 - **Βάση:** Ισχύει για $n = 1$.
 - **Επαγωγική υπόθεση:** Έστω ότι για (αυθαιρετα επιλεγμένο) $n \geq 1$, σε κάθε σύνολο n αυτοκινήτων, όλα έχουν το ίδιο χρώμα.
 - **Επαγωγικό βήμα:** Θδο σε κάθε σύνολο $n+1$ αυτοκινήτων, όλα έχουν το ίδιο χρώμα.
 - Σύνολο με $n+1$ αυτοκίνητα: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}$
 - Από επαγ. υπόθεση, τα **η πρώτα αυτοκίνητα έχουν ίδιο χρώμα, και η τελευταία αυτοκίνητα έχουν ίδιο χρώμα:**
$$\overbrace{\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}^{\text{ίδιο χρώμα}, \text{αυτοκίνητα}} \quad \overbrace{\{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}}^{\text{ίδιο χρώμα}, \text{αυτοκίνητα}}$$
- **Αφού σύνολο η πρώτων και σύνολο η τελευταίων αυτοκινήτων έχουν κοινά στοιχεία, όλα τα αυτοκ. στο A έχουν ίδιο χρώμα!**

Λάθος Χρώμα!

- **Επαγωγικό βήμα:** Θδο σε κάθε σύνολο $n+1$ αυτοκινήτων, όλα έχουν το ίδιο χρώμα.
 - Σύνολο με $n+1$ αυτοκίνητα: $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}\}$
 - Από επαγ. υπόθεση, τα **η πρώτα αυτοκίνητα έχουν ίδιο χρώμα, και η τελευταία αυτοκίνητα έχουν ίδιο χρώμα:**
$$\overbrace{\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}}^{\text{ίδιο χρώμα}}, \alpha_{n+1}$$
$$\{\alpha_1, \overbrace{\alpha_2, \dots, \alpha_n}^{\text{ίδιο χρώμα}}, \alpha_{n+1}\}$$
- Αφού **σύνολο η πρώτων και σύνολο η τελευταίων αυτοκινήτων έχουν κοινά στοιχεία**, όλα τα αυτοκ. στο A έχουν ίδιο χρώμα!
- Για $n = 1$, τα δύο σύνολα **δεν** έχουν **κοινά** στοιχεία!
- Εδώ ισχύει ότι $P(1)$ και ότι $P(n) \rightarrow P(n+1)$ για κάθε $n \geq 2$.
 - **Δεν ισχύει ότι $P(1) \rightarrow P(2)$:** αυτό καθιστά συμπέρασμα αβάσιμο!

Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης

- Κάποτε χρήσιμο να αποδείξουμε **ισχυρότερη** πρόταση $P'(n)$.
 - Είναι δυνατό να **μην** ισχύει ότι $P(n) \rightarrow P(n+1)$, αλλά να ισχύει $P'(n) \rightarrow P'(n+1)$, για **ισχυρότερη** πρόταση $P'(n)$.

- Νδο. για κάθε $n \geq 1$,

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^n} \leq 2$$

- Επαγωγική υπόθεση $S_n \leq 2$ δεν συνεπάγεται ότι $S_{n+1} \leq 2$.

- Ευκολότερο νδ (επαγωγικά) ότι για κάθε $n \geq 1$,


$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης


- Κάποτε χρήσιμο να αποδείξουμε **ισχυρότερη** πρόταση $P'(n)$.
 - Είναι δυνατό να **μην** ισχύει ότι $P(n) \rightarrow P(n+1)$, αλλά να ισχύει $P'(n) \rightarrow P'(n+1)$, για **ισχυρότερη** πρόταση $P'(n)$.
- **Σκακιέρα** τάξης n με μαύρο στο **κέντρο**: τετράγωνη σκακιέρα με $2^n \times 2^n$ τετράγωνα, όλα λευκά εκτός από **ένα** μαύρο στο **κέντρο**.
- Ν.δ.ο. για κάθε $n \geq 0$, **λευκά** τετράγωνα **σκακιέρας** τάξης n με μαύρο στο **κέντρο** καλύπτονται από **πλακίδια** σχήματος L (μη επικαλυπτόμενα).




$n = 0$




$n = 1$



$n = 2$





$n = 3$



Πλακίδιο
σχήματος L


Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης

- Βάση: **P(0)** ισχύει (δεν υπάρχουν λευκά τετράγωνα).
- Επαγωγικό βήμα:
 - Σκακιέρα **τάξης $n+1$** με μαύρο στο κέντρο:
ένωση 4 σκακιέρων **τάξης n** με μαύρο στο κέντρο,
3 μαύρα γίνονται λευκά, 1 μαύρο μετακινείται στο κέντρο.




Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης

- Βάση: **P(0)** ισχύει (δεν υπάρχουν λευκά τετράγωνα).
- Επαγωγικό βήμα:
 - $P(0) \rightarrow P(1)$, $P(1) \rightarrow P(2)$: 3 νέα λευκά καλύπτονται με 1 πλακίδιο.
- $P(2) \rightarrow P(3)$:
 - Λευκά όχι γειτονικά, μετακινήσεις επηρεάζουν διάταξη πλακιδίων!
 - Χρήση επαγωγικής υπόθεσης όχι προφανής!
- Δυσκολία λόγω **περιορισμού** ότι μαύρο **στο κέντρο**!






Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης

- **Σκακιέρα τάξης n :** τετράγωνη σκακιέρα με $2^n \times 2^n$ τετράγωνα, όλα λευκά εκτός από ένα μαύρο (οπουδήποτε).
- Ν.δ.ο. για κάθε $n \geq 0$, λευκά τετράγωνα σκακιέρας τάξης n καλύπτονται από πλακίδια σχήματος L (μη επικαλυπτόμενα).
 - Πρόταση $P'(n)$ ισχυρότερη από αρχική $P(n)$.
 - Βάση: $P'(0)$ ισχύει τετριμένα.
 - Επαγωγική υπόθεση: για (αυθαίρετα επιλεγμένο) $n \geq 0$, αληθεύει ότι λευκά τετράγωνα οποιασδήποτε σκακιέρας τάξης n καλύπτονται από πλακίδια σχήματος L .



Ρόλος Επαγωγικής Υπόθεσης

- Σκακιέρα **τάξης $n+1$** : 4 σκακιέρες τάξης n (**τεταρτημόρια**).
 - 1 με μαύρο τετράγωνο σε **αντίστοιχη θέση**.
 - 3 με μαύρα τετράγωνα σε άκρα, ώστε **γειτονικά κεντρικά τετράγωνα** σε σκακιέρα $n+1$.
- Από **επαγωγική υπόθεση**, λευκά τετράγωνα σε τεταρτημόρια καλύπτονται από πλακίδια L .
- Νέα λευκά τετράγωνα **σχηματίζουν L** : καλύπτονται με πλακίδιο.



Παράδειγμα Ισχυρής Επαγωγής

- Νδο κάθε τμήμα του λ. 18 φοιτητών διαμερίζεται σε ομάδες 4 ή 7 φοιτητών.
 - Για κάθε φυσικό $n \geq 18$, υπάρχουν φυσικοί κ_n, λ_n : $n = 4\kappa_n + 7\lambda_n$.
- Βάση: επαλήθευση για $n = 18$
- Επαγωγική υπόθεση: για (αυθαίρετα επιλεγμ.) φυσικό $n \geq 18$, ισχύει ότι για κάθε φυσικό m , $18 \leq m \leq n$:
 - Υπάρχουν φυσικοί κ_m, λ_m : $m = 4\kappa_m + 7\lambda_m$.
- Επαγωγικό βήμα: Θδο υπάρχουν φυσικοί $\kappa_{n+1}, \lambda_{n+1}$:
$$n+1 = 4\kappa_{n+1} + 7\lambda_{n+1}.$$
 - Επαγ. υπόθεση για $n - 3$, και $\kappa_{n+1} = \underbrace{\kappa_{n-3} + 1}_{=n-3}$ και $\lambda_{n+1} = \lambda_{n-3}$:
$$4(\kappa_{n-3} + 1) + 7\lambda_{n-3} = (\overbrace{4\kappa_{n-3} + 7\lambda_{n-3}}^{=n-3}) + 4 = n + 1$$
- Αρκεί βάση για $n = 18$; Γιατί $n \geq 21$ στην υπόθεση;

Kai 'Άλλο Λάθος!

- Θδο όλοι οι φυσικοί αριθμοί είναι άρτιοι(;)!
 - Βάση: ισχύει ότι το 0 είναι άρτιος.
 - Επαγωγική υπόθεση: για (αυθαίρετα επιλεγμένο) φυσικό $n \geq 0$, ισχύει ότι για κάθε m , $0 \leq m \leq n$, το m είναι άρτιος.
 - Επαγωγικό βήμα: Θδο το $n+1$ είναι άρτιος.
 - Επαγωγική υπόθεση: το n και το 1 είναι άρτιοι.
 - Άρα $n+1$ άρτιος, ως άθροισμα δύο άρτιων!
- Απόδειξη βήματος **δεν** ισχύει για $n = 0$!
 - Χρησιμοποιεί ότι το 1 είναι άρτιος **χωρίς απόδειξη** (στη βάση) και **χωρίς να εμπίπτει** στην επαγωγική υπόθεση!