

Χρωματικός Αριθμός, Κάλυμμα Κορυφών

Διδάσκοντες: **Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**


Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο





Χρωματικός Αριθμός

- **k-μερές γράφημα:** κορυφές του διαμερίζονται σε k ανεξάρτητα σύνολα.
 - Ενδιαφέρει ελάχιστο k για το οποίο γράφημα G είναι k -μερές.
 - Αυτό ταυτίζεται με χρωματικό αριθμό $\chi(G)$ γραφήματος G .
- **Χρωματικός αριθμός:** ελάχιστος αριθμός χρωμάτων για χρωματισμό κορυφών ώστε όλες οι ακμές να έχουν άκρα διαφορετικού χρώματος.
 - Κορυφές ίδιου χρώματος:
ανεξάρτητο σύνολο.
 - Αν G περιέχει K_m , $\chi(G) \geq m$
 - $\chi(C_n) = 2$, αν n άρτιος,
και 3, αν n περιττός.
 - Επίπεδο γράφημα G , $\chi(G) \leq 4$.



Χρωματικός Αριθμός

- **Χρωματικός αριθμός:** ελάχιστος αριθμός χρωμάτων για χρωματισμό κορυφών ώστε όλες οι ακμές να έχουν άκρα διαφορετικού χρώματος.
 - Κορυφές ίδιου χρώματος: ανεξάρτητο σύνολο.




Άσκηση

- Νδο σε κάθε γράφημα $G(V, E)$, $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$.
 - Βάση: Ισχύει για κάθε γράφημα με $n = 1, 2$ κορυφές.
 - Επαγωγική υπόθεση: για αυθαίρετα επιλεγμένο $n \geq 2$, ισχύει ότι $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$ για κάθε γράφημα G με n κορυφές.
 - Επαγωγικό βήμα: 'Εστω γράφημα G' με $n+1$ κορυφές. Θότε $\chi(G') \leq \Delta(G')+1$.
 - 'Έστω αυθαίρετη κορυφή u του G' και $G_u = G' - u$.
 - Από επαγωγική υπόθεση: $\chi(G_u) \leq \Delta(G_u)+1 \leq \Delta(G')+1$.
 - Η κορυφή u παίρνει ένα από τα $\Delta(G')+1$ χρώματα.
 - 'Έγκυρος χρωματισμός γιατί $\deg(u) \leq \Delta(G')$: ένα από αυτά τα χρώματα δεν χρησιμοποιείται στη γειτονιά $N(u)$.
- 'Έστω συνεκτικό γράφημα G που δεν είναι πλήρες ούτε κύκλος περιπτού μήκους. Τότε $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Άσκηση

- Νδο σε κάθε **επίπεδο** γράφημα $G(V, E)$, $\chi(G) \leq 5$.
 - Βάση: Ισχύει για κάθε επίπεδο γράφημα με $n = 1, 2, \dots, 5$ κορυφές.
 - Επαγωγική υπόθεση: για αυθαιρετα επιλεγμένο $n \geq 5$, ισχύει ότι $\chi(G) \leq 5$ για κάθε επίπεδο γράφημα G με n κορυφές.
 - Επαγωγικό βήμα: Επίπεδο γράφημα G' με $n+1$ κορυφές: $\chi(G') \leq 5$
 - Κορυφή u με βαθμό ≤ 5 και $N(u) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$.
 - (Τουλ.) δύο κορυφές στο $N(u)$ δεν συνδέονται (έστω οι v_1 και v_2).
 - G'' (επίπεδο) γράφημα όπου $\{u, v_1\}, \{u, v_2\}$ έχουν συμπτυχθεί σε w .
 - Επαγ. Υπόθ.: $\chi(G'') \leq 5$ με $\text{χρώμα}(w) = 1$, $\text{χρώμα}(v_k) = k$, $k = 3, 4, 5$
 - Θέτουμε $\text{χρώμα}(v_1) = \text{χρώμα}(v_2) = 1$, $\text{χρώμα}(u) = 2$.





Σχέση με Ανεξάρτητα Σύνολα

- $a(G)$: #κορυφών στο **μέγιστο** ανεξάρτητο σύνολο (independence number).
- Νδο σε κάθε γράφημα G , $n - a(G) + 1 \geq \chi(G) \geq n/a(G)$
 - Χρωματίζουμε μέγιστο ανεξάρτητο σύνολο με ένα χρώμα και άλλες κορυφές με διαφορετικά χρώματα: $\chi(G) \leq n - a(G) + 1$
 - $a(G) \geq n/\chi(G)$ γιατί περισσότερες κορυφές με ίδιο χρώμα είναι τουλάχιστον τόσες.
- Νδο σε κάθε γράφημα G , $\chi(\overline{G}) \geq n/\chi(G)$.
 - Μέγιστο ανεξάρτητο σύνολο I έχει τουλάχιστον $n/\chi(G)$ κορυφές.
 - Στο συμπληρωματικό γράφημα, οι κορυφές του I αποτελούν πλήρες γράφημα και χρειάζονται τουλάχιστον $n/\chi(G)$ χρώματα.



Ταιριάσματα (Matchings)

- Ταιριάσμα σε γράφημα $G(V, E)$: σύνολο ακμών $M \subseteq E$ χωρίς κοινά άκρα.
 - Κορυφή βαθμού 1 στο M : **ταιριάσμένη**. Διαφορετικά **ελεύθερη**.
 - M τέλειο ταιριάσμα αν **όλες** οι κορυφές του G **ταιριάσμένες**.
 - M μέγιστο ταιριάσμα αν για κάθε ταιριάσμα M' , $|M| \geq |M'|$.
 - M **μεγιστικό (maximal)** αν καμία ακμή στο E δεν έχει δύο ελεύθερα άκρα.
 - M **μεγιστικό** ανν **ελεύθερες** κορυφές **αποτελούν ανεξάρτητο σύνολο**.



Κάλυμμα Κορυφών (Vertex Cover)

- Γράφημα $G(V, E)$: κάλυμμα κορυφών $C \subseteq V$ αν κάθε ακμή έχει τουλάχιστον ένα από τα άκρα της στο C .
 - C κάλυμμα κορυφών ανν $V \setminus C$ ανεξάρτητο σύνολο.
 - $\beta(G)$: #κορυφών στο **ελάχιστο** κάλυμμα κορυφών.
 - Σε κάθε γράφημα G , $\beta(G) + \alpha(G) = n$



Κάλυμμα Κορυφών (Vertex Cover)

- Γράφημα $G(V, E)$: κάλυμμα κορυφών $C \subseteq V$ αν κάθε ακμή έχει τουλάχιστον ένα από τα άκρα της στο C .
 - C κάλυμμα κορυφών ανν $V \setminus C$ ανεξάρτητο σύνολο.
 - $\beta(G)$: #κορυφών στο **ελάχιστο** κάλυμμα κορυφών.
 - Σε κάθε γράφημα G , $\beta(G) + a(G) = n$
 - Έστω κάλυμμα κορυφών C και ταίριασμα M : $|C| \geq |M|$.
 - Αν $|C| = |M|$, το C είναι **ελάχιστο** κάλυμμα κορυφών και το M είναι **μέγιστο** ταίριασμα.

