

# Ολοκληρώματα

(Περιλαμβάνει Σχολική Ύλη)

Βασίλειος Γρηγοριάδης

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

# Ολοκλήρωμα συνεχούς συνάρτησης

## Το εμβαδόν ως όριο

**Διευκρίνιση** Εκτός αν λέμε διαφορετικά με τον όρο "ολοκλήρωμα" εννοούμε "ορισμένο ολοκλήρωμα".



**Κίνητρο.** Εύρεση εμβαδών και όγκων (Εύδοξος - Αρχιμήδης).

**Μοντέρνα διατύπωση.** Εύρεση εμβαδού ανάμεσα στη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  και του άξονα  $x$ .

Θεωρούμε μια συνεχή συνάρτηση  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  και  $n \in \mathbb{N}$ .

Διαιρούμε το  $[a, b]$  σε  $n$ -το πλήθος ίσα και διαδοχικά υποδιαστήματα και παίρνουμε τα ορθογώνια που σχηματίζονται από αυτά τα διαστήματα και τη γραφική παράσταση της  $f$ .

**Σχήματα:** Επιτυγχάνουμε μια προσέγγιση του εμβαδού από κάτω (μπλε ορθογώνια) και από πάνω (μπλε και πράσινα ορθογώνια).



Όσο πιο μεγάλο το  $n$   
τόσο καλύτερη η προσέγγιση


Τα μπλε εμβαδά όπως επίσης μαζί με τα πράσινα «πλησιάζουν» κάποιον πραγματικό αριθμό, ο οποίος εκφράζει την έννοια του εμβαδού ανάμεσα στη γραφική παράσταση της  $f$  και του άξονα  $x'x$ .

Ο αριθμός που «πλησιάζουν» ονομάζεται **ορισμένο ολοκλήρωμα της  $f$**  και συμβολίζεται με  $\int_a^b f(x)dx$ . Δηλαδή

$\int_a^b f(x)dx =$  ο αριθμός που πλησιάζουν τα μπλε εμβαδά

$=$  ο αριθμός που πλησιάζουν τα μπλε+πράσινα εμβαδά  
(στο προηγούμενο σχήμα)

Όταν η γραφική παράσταση της  $f$  είναι κάτω από τον άξονα  $x'x$  προσμετράμε το εμβαδόν αρνητικά.



Η έννοια του ολοκληρώματος επεκτείνεται και σε μια μεγάλη κατηγορία μη συνεχών συναρτήσεων, αλλά εμείς θα περιοριστούμε στις συνεχείς.

Αν έχουμε μια συνάρτηση  $f: [a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  τότε **ορίζουμε** το ολοκλήρωμά της να είναι **μηδέν**, δηλαδή

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Χρήσιμος **συμβολισμός**: αν  $a < b$  με  $\int_b^a f(x) dx$  εννοούμε τον **αντίθετο** αριθμό του ολοκληρώματος, δηλαδή

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

(Το  $\int_b^a f(x) dx$  παύει να έχει το νόημα εμβαδού.)

Αν η συνάρτηση  $f$  ορίζεται σε ένα σύνολο που περιέχει το κλειστό διάστημα  $[a, b]$  με  $\int_a^b f(x) dx$  εννοούμε το ολοκλήρωμα του **περιορισμού της  $f$**  στο  $[a, b]$ .

Π.χ. αν  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μπορούμε πάλι να πάρουμε το  $\int_0^1 f(x) dx$ .

## Ιδιότητες Ολοκληρώματος

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b \lambda \cdot f(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\min(f | [a, b]) \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max(f | [a, b]) \cdot (b - a)$$

$$f \leq g \text{ στο } [a, b] \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

## Το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού


Θεωρούμε ότι έχουμε μια συνεχή συνάρτηση  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

Ορίζουμε τη συνάρτηση  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  με

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Παρατηρούμε ότι  $F(a) = 0$  και  $F(b) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$ .

Παράδειγμα: δίνεται η πιο κάτω  $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ , η τιμή  $F(1)$  είναι το εμβαδόν της πράσινης περιοχής





## Θεώρημα: (Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού - Fundamental Theorem of Calculus)

Θεωρούμε μια συνεχή συνάρτηση  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  και την  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  με  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ . Τότε η  $F$  είναι συνεχής, διαφορίσιμη και

$$F'(x) = f(x), \quad x \in [a, b].$$

**Πόρισμα.** Δίνονται δύο συναρτήσεις  $F, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a < b$  με την  $f$  συνεχή και την  $F$  παραγωγίσιμη. Αν  $F' = f$  τότε

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Με άλλα λόγια αν μπορούμε να βρούμε μια συνάρτηση  $F$  με  $F' = f$  τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το  $\int_a^b f(x)dx$ .

**Παρατηρήσεις.** 1) Η διαφορά  $F(b) - F(a)$  **συμβολίζεται** συνήθως με  $F(x)|_a^b$  ή  $[F(x)]_a^b$ .

2) Ο τύπος  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$  ισχύει και για  $b \leq a$ . Αυτό προκύπτει εύκολα από τον κανονικό τύπο. Π.χ. για  $b = 1$  και  $a = 2$  έχουμε

$$\int_2^1 f(x)dx = - \int_1^2 f(x)dx = -(F(2) - F(1)) = F(1) - F(2).$$

*Απόδειξη του Πορίσματος.* Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$F_0(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b]. \quad \text{Τότε}$$

$$F_0'(x) = f(x) = F'(x), \quad \text{για κάθε } x \in [a, b].$$

Άρα  $F_0' = F'$  ή αλλιώς  $(F - F_0)' = 0$ . Επομένως  $F - F_0 = c \in \mathbb{R}$   
και

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= F_0(b) = F_0(b) - F_0(a) \\ &= F_0(b) + c - (F_0(a) + c) = F(b) - F(a). \end{aligned}$$

*Παράδειγμα.* Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα  $\int_0^1 x^2 dx$ .

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $F(x) = \frac{x^3}{3}$  για  $x \in [0, 1]$  και

παρατηρούμε ότι  $F'(x) = x^2$ ,  $x \in [0, 1]$ . Άρα

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

## Αόριστο Ολοκλήρωμα

Μια συνάρτηση  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  είναι **παράγουσα** (anti-derivative) της  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  αν  $F' = f$ . Π.χ. η  $F(x) = x^3$ ,  $x \in [0, 1]$  είναι παράγουσα της  $f(x) = 3x^2$ .

Η παράγουσα εφόσον υπάρχει δεν είναι μοναδική, για την ακρίβεια **δύο** παράγουσες της **ίδιας** συνάρτησης **διαφέρουν** κατά μία **σταθερά**.

Με τον όρο **αόριστο ολοκλήρωμα** μιας συνάρτησης  $f$  εννοούμε μια **οποιαδήποτε παράγουσα** της  $f$ . (Κάποιοι συγγραφείς ορίζουν το αόριστο ολοκλήρωμα ως το **σύνολο** όλων των παραγουσών.)

Συμβολίζουμε το αόριστο ολοκλήρωμα της  $f$  με  $\int f(x) dx$ .

**Αιτιολόγηση συμβολισμού.** Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού  $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ .

Αν  $F' = f$  γράφουμε

$$\int f(x) dx = F(x) + c \quad c \in \mathbb{R}.$$

**Αιτιολόγηση.** Τα  $\int f(x) dx$  και  $F$  είναι παράγουσες της συνάρτησης  $f$  επομένως διαφέρουν κατά μία σταθερά.

Η σταθερά  $c$  είναι ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός και ονομάζεται **σταθερά ολοκλήρωσης**.

Γενικά η σταθερά  $c$  παραμένει ως έχει χωρίς να την προσδιορίζουμε. Από την άλλη κάποια προβλήματα παρέχουν δεδομένα που μας επιτρέπουν τον προσδιορισμό της σταθεράς.

## Στοιχειώδη αόριστα ολοκληρώματα

$$\int K dx = K \cdot x + c$$

$$\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \text{ όπου } \alpha \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c \quad \text{ή} \quad \ln(-x) + c = \ln|x| + c$$

(ανάλογα με το αν το  $x$  είναι θετικό ή αρνητικό)

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad (a > 0, a \neq 1)$$