

Σύνολα

Διδάσκοντες: **Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Ορισμός Συνόλου

- Σύνολο είναι μια συλλογή διακεκριμένων αντικειμένων.
 - Π.χ. {Δημήτρης, Ανδρέας, Άρης}, {α, β}, {α, {α}}, {{α}}},
 $N = \{0, 1, \dots\}$, {1, 3, 5, 7, ...}, {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}
 - Αντικείμενα όχι κατ' ανάγκη ομοειδή
π.χ. {Δημήτρης, 1, α, 1041, {α, β, γ}, {{}}, PC1}
 - Μέλη ή στοιχεία του συνόλου: $x \in \{x, y, z\}$, $a \notin \{x, y, z\}$
 - Κάθε αντικείμενο είτε είναι μέλος ενός συνόλου είτε όχι.
- Σύνολο ορίζεται:
 - με απαρίθμηση των στοιχείων του, π.χ. {α, β, γ}
 - με χαρακτηριστική ιδιότητα των στοιχείων του,
π.χ. $E = \{x \in N: x \text{ ἀρτιος}\}$, $A = \{x \in U: P(x)\}$
 - ως αποτέλεσμα πράξεων σε σύνολα που έχουν ήδη ορισθεί.

Ορισμός Συνόλου

- Στοιχεία ενός συνόλου:
 - Δεν επαναλαμβάνονται, π.χ. $\{\alpha, \beta\}$ και όχι $\{\alpha, \alpha, \beta\}$.
 - Επανάληψη στοιχείων: **πολυσύνολα**.
 - Δεν υπάρχει διάταξη, π.χ. $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{\gamma, \beta, \alpha\} = \{\beta, \alpha, \gamma\}$
- Σύνολα A και B **ταυτίζονται** ($A = B$) ανν περιέχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία.
- **Πληθικός αριθμός** (πεπερασμένου) συνόλου A :
#στοιχείων A , $|A|$.
 - Πεπερασμένα και **άπειρα** σύνολα.


Υποσύνολα και Κενό Σύνολο

- **Α υποσύνολο Β** (γράφουμε $A \subseteq B$) αν κάθε στοιχείο του Α ανήκει στο Β:
 - Π.χ. $\{a, b\} \subseteq \{a, b, \dots, z\}$, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$, $\{2, 4, 6, 8, 10\} \not\subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 - Για κάθε σύνολο Α, $A \subseteq A$.
 - $A = B$ ανν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$.
 - Αν $A = B$, τότε **Α και Β ισάριθμα**.
 - Αν $A \subseteq B$, τότε $|A| \leq |B|$.
 - Α γνήσιο υποσύνολο Β ($A \subset B$): $A \subseteq B$ και $A \neq B$.
 - Υπάρχουν σύνολα Α, Β, τ.ω. $B \subset A$ και **ισάριθμα**;
 - Σύνολο Α **άπειρο** ανν υπάρχει $A \subset B$ τ.ω. Α και Β είναι **ισάριθμα(!)**
- **Κενό σύνολο** ($\{\}$ ή \emptyset): σύνολο χωρίς κανένα στοιχείο.
 - $|\emptyset| = 0$.
 - Για κάθε σύνολο Α, $\emptyset \subseteq A$ (απόδειξη;).
 - Κενό σύνολο είναι μοναδικό (απόδειξη;).

Δυναμοσύνολο

- **Δυναμοσύνολο** συνόλου A , $P(A)$ ή 2^A , είναι σύνολο με στοιχεία όλα τα υποσύνολα του A : $P(A) = \{B : B \subseteq A\}$
 - $P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
 - $2^{\{\alpha, \beta, \gamma\}} = \{\emptyset, \{\alpha\}, \{\beta\}, \{\gamma\}, \{\alpha, \beta\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$
 - $\emptyset \in P(A)$ και $A \in P(A)$, για κάθε σύνολο A .
 - $2^\emptyset = \{\emptyset\}$. $2^{P(\emptyset)} = ?$. $2^{P(\{\emptyset\})} = ?$.
- Για κάθε πεπερασμένο σύνολο A , $|2^A| = 2^{|A|}$.
 - Απόδειξη με επαγωγή και με συνδυαστικό επιχείρημα.
- \subseteq και \in . Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν;
 - $2 \in \{1, 2, 3\}$. $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$. $2 \subseteq \{1, 2, 3\}$.
 - $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$. $\{2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$. $\{2\} \in \{\{1\}, \{2\}\}$.


Διαγράμματα Venn




- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.

Ορθογώνιο αναπαριστά σύμπαν U που
περιέχει όλα τα αντικείμενα.

Ελλείψεις αναπαριστούν σύνολα υπό μελέτη.




Διαγράμματα Venn



- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.

B (γνήσιο) υποσύνολο A




Διαγράμματα Venn




- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.

A και B δεν έχουν κοινά στοιχεία
(ξένα μεταξύ τους)



Πράξεις Συνόλων


- **Ένωση** συνόλων A και B , $A \cup B$:
 - Σύνολο με στοιχεία που ανήκουν στο A ή στο B (ή και στα δύο).
 - Π.χ. $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$.
 $\{0, 2, 4, 6, \dots\} \cup \{1, 3, 5, 7, \dots\} = \mathbb{N}$.
 - Αντιμεταθετική, προσεταιριστική, $A \cup \emptyset = A$, $A \cup A = A$, ορίζεται η ένωση $n \geq 2$ συνόλων.
 - $A \subseteq B$ ανν $A \cup B = B$.
Ειδικά $A \cup U = U$.
 - $A \subseteq A \cup B$, για κάθε B .
 - Av $A, B \subseteq C$, τότε $A \cup B \subseteq C$.



Πράξεις Συνόλων


□ **Τομή** συνόλων A και B , $A \cap B$:

- Σύνολο με κοινά στοιχεία **A και B** .
- Π.χ. $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$.
 $\{0, 2, 4, 6, \dots\} \cap \{1, 3, 5, 7, \dots\} = \emptyset$
- Αντιμεταθετική, προσεταιριστική, $A \cap U = A$, $A \cap A = A$, ορίζεται η τομή $n \geq 2$ συνόλων.
- $A \subseteq B$ ανν $A \cap B = A$.
Ειδικά $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- $A \cap B \subseteq A$, για κάθε B .
Αν $A, B \subseteq C$, τότε $A \cap B \subseteq A \cup B \subseteq C$.
- **Επιμεριστική** ιδιότητα τομής ως προς ένωση και ένωσης ως προς τομή.
- Αν $A \cap B = \emptyset$, A και B **ξένα** ή **διαζευγμένα** σύνολα.




Πράξεις Συνόλων

- **Διαφορά** συνόλου A από σύνολο B , $A - B$:
 - Σύνολο με στοιχεία του A που δεν ανήκουν στο B .
 - Π.χ. $\{1, 2, 3\} - \{2, 3, 4\} = \{1\}$,
 - $\{2, 3, 4\} - \{1, 2, 3\} = \{4\}$,
 - $\mathbb{N} - \{0, 2, 4, 6, \dots\} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.
 - Όχι αντιμεταθετική!
- **Συμπλήρωμα** συνόλου A , \overline{A} :
 - Σύνολο με στοιχεία που δεν ανήκουν στο A , $U - A$.
 - Συμπλήρωμα $\emptyset = U$.
 - Συμπλήρωμα $U = \emptyset$.
 - $A - B = A \cap \overline{B}$




Πράξεις Συνόλων

- **Συμμετρική διαφορά** συνόλων A και B , $A \oplus B$:
 - Σύνολο με στοιχεία που ανήκουν **είτε στο A είτε στο B** αλλά **όχι και στα δύο**.
 - $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$



Διαμέριση Συνόλου

- Μη κενό σύνολο A . Συλλογή A_1, A_2, \dots, A_n μη κενών **υποσυνόλων** του A αποτελεί **διαμέριση** του A ανν:
 - $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$
 - Τα A_1, A_2, \dots, A_n είναι ανά δύο ξένα μεταξύ τους.
- Παραδείγματα:
 - Τα $\{0, 2, 4, \dots\}$ και $\{1, 3, 5, \dots\}$ αποτελούν διαμέριση του N .
 - Τα $\{-1, -2, -3, \dots\}, \{0\}, \{1, 2, 3, \dots\}$ αποτελούν διαμέριση του Z .



Ιδιότητες Πράξεων Συνόλων

Αντιμεταθετική	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Προσεταιριστική	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Επιμεριστική	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Κανόνας συμπλήρωσης	$\overline{\overline{A}} = A$

Ιδιότητες Πράξεων Συνόλων (II)

Ουδέτερο στοιχείο	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$
Απορροφητικό στοιχείο	$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup U = U$
Αυτοπάθεια	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Κανόνας Απορρόφησης	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
Κανόνας De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Πράξεις Συνόλων

- Αντιστοιχία πράξεων συνόλων με λογικούς συνδέσμους.
 - Στοιχεία συνόλου A έχουν ιδιότητα (α).
 - Στοιχεία συνόλου B έχουν ιδιότητα (β).
 - Π.χ. στοιχεία συνόλου $A \cup B$ έχουν ιδιότητα (α) \vee (β).
- Ιδιότητες πράξεων συνόλων και σχέσεων μεταξύ συνόλων ελέγχονται / αποδεικνύονται με **membership tables**.
 - Πίνακες που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το που ανήκει ένα στοιχείο.
 - Ισοδύναμο των **πινάκων αλήθειας**.

Παράδειγμα Membership Table

- Παράδειγμα membership table για επιμεριστική ιδιότητα της τομής ως προς την ένωση.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Παραδείγματα

- Ν.δ.o. $(A \cup B) \cap \overline{B} = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$
 - Αρκεί ν.δ.o. $A - B = A$ ανν $A \cap B = \emptyset$, αφού
$$\begin{aligned}(A \cup B) \cap \overline{B} &= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{B}) \\ &= A \cap \overline{B} \\ &= A - B\end{aligned}$$
- Ν.δ.o. $\overline{(A \cup B)} \cap \overline{A} = A$
$$\overline{(A \cup B)} \cap \overline{A} = \overline{\overline{A}} = A$$
- Ν.δ.o. $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$.
- Ν.δ.o. $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$. Να δώσετε παράδειγμα όπου το 1^o είναι γνήσιο υποσύνολο του 2^{oυ}.

Παραδείγματα

□ Ν.δ.ο. $(A - B) - C = A - (B \cup C)$

$$\begin{aligned}(A - B) - C &= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= A \cap (\overline{B \cup C})\end{aligned}$$

□ Ν.δ.ο. $(A - B) - C = (A - C) - B$

■ $(A - B) - C = A - (B \cup C)$
 $= A - (C \cup B)$
 $= (A - C) - B$

Παραδείγματα

□ Ν.δ.ο. $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

$$\begin{aligned}(A - C) - (B - C) &= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cap \overline{\overline{C}}) \\&= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) \\&= (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) \cup \overbrace{(A \cap \overline{C} \cap C)}^{=\emptyset} \\&= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\&= (A - B) - C\end{aligned}$$